

トレムフィア.jpのご紹介

トレムフィア®に対する理解を深め、正しくご使用いただけるよう、トレムフィア®をご使用になる乾癬患者さんとご家族に向けた情報を提供しております。
ぜひ一度アクセスしてください。



トレムフィア® をご使用になる患者さんへ

監修：帝京大学医学部 皮膚科学講座 主任教授
多田 弥生 先生

医療機関名



ヤンセンファーマ株式会社

TRM-0009
TRM.Pt001.5
2025年1月作成

Johnson&Johnson

乾癬の治療目標

乾癬は、慢性の炎症性の皮膚疾患ですが、治療により症状を抑えることができます。乾癬の治療には、塗り薬や飲み薬による治療法、光線療法のほかに、生物学的製剤による治療法があり、これまでに長く使われてきています。これらの中から、あなたの希望やライフスタイルにあった治療法に出合うことがとても大切です。

乾癬の症状を抑え、あなたのやりたいことを実現するためには、治療をしっかりと継続することが重要です。あなたの想いや希望を主治医に伝え、前向きな気持ちで一緒に治療に取り組んでいきましょう。

目次

乾癬の治療目標	2
乾癬はどのような病気ですか？	3
トレムフィア®はどのように効くのですか？	4
コラム：トレムフィア®はヒト型モノクローナル抗体製剤です	5
トレムフィア®による治療について	6
トレムフィア®の投与スケジュール	7
トレムフィア®による治療中の注意	8
副作用について	9
トレムフィア®治療Q&A	10



乾癬はどのような病気ですか？

乾癬は、主に皮膚に症状が現れる慢性の病気です。

症状によっていくつかの種類に分類されますが、特徴的な症状として、皮膚が赤くなる「紅斑」、もりあがる「浸潤」、細かいかさぶたのような「鱗屑」、フケのようにボロボロとはがれ落ちる「落屑」がみられます。また、関節が腫れたり痛んだりすることがあります。

外敵から体を守る免疫作用の過剰な働きが主な原因で、感染する病気ではありません。遺伝や生活習慣などさまざまな理由によって発症すると考えられています。

●主な乾癬の種類

じんじょうせいかんせん
尋常性乾癬

かんせんせいかんせつえん
乾癬性関節炎

のうほうせいかんせん
膿疱性乾癬

かんせんせいこうひしょう
乾癬性紅皮症

乾癬の中で最も多い種類であり、一般に乾癬といえば、尋常性乾癬を指します。全体の約9割を占めます。「紅斑」「浸潤」「鱗屑」「落屑」がみられます。

関節が腫れたり、痛んだり、ときに強い変形をきたすことがあります。多くの場合、皮疹が出た後に関節の症状が現れます。

発熱、悪寒、全身倦怠感などと共に、急に全身の皮膚が赤くなり（紅斑）、無菌性の膿疱（うみをもった状態）が多数現れます。

尋常性乾癬の皮疹が全身に広がり、皮膚全体の80%以上が赤くなった状態をいいます。




トレムフィア®はどのように効くのですか？

トレムフィア®は、IL(インターロイキン)-23という物質の働きを抑えるお薬です。IL-23は、リンパ球に働くことにより、乾癬の皮膚や関節の症状を引き起こすIL-17を多く放出させます。乾癬の患者さんでは、IL-23が過剰に増えていますが、トレムフィア®を投与することでIL-23の働きを抑え、IL-17の放出を減らすことができます。

●乾癬の症状が現れるメカニズム

IL-23によってリンパ球が刺激されると、リンパ球が炎症などを引き起こすIL-17を放出し、皮膚や関節の症状が現れます。



●トレムフィア®を投与した場合

トレムフィア®を投与すると、IL-23の働きが抑えられ、リンパ球からのIL-17の放出が減ります。それにより、皮膚や関節の症状が改善します。




コラム

トレムフィア®はヒト型モノクローナル抗体製剤です

人の体内ではウイルスなどの病気の原因となる物質(抗原)は、免疫が働いて異物と認識されると「抗体」により排除されます。この仕組み(抗原抗体反応)を利用した医薬品が「抗体製剤」です。抗原に対する抗体を人工的に作って体内に入れ、抗原の働きを抑えることで、病気を治療します。

抗体製剤は、特定の抗原タンパク質を標的として結合し、抗原タンパク質が病気を引き起こしたり、進行させたりすることを抑制して、効果を発揮します。遺伝子工学の技術を用いて作製され、由来となる抗体タンパク質のアミノ酸配列により構造が異なり、従来はマウス由来でしたが、現在はヒト由来のものが主流です(図)。

トレムフィア®は、乾癬などで免疫機能に異常をきたし過剰に増えている抗原タンパク質、IL-23を標的とした抗体製剤で、完全ヒト型抗体製剤の1つです。



トレムフィア®による治療について

トレムフィア®は皮下に投与する注射薬です。

投与は医療機関で医師または看護師によって行われます。

注射をする部位は、二の腕(上腕部)の外側、おなか(下腹部)、太もも(大腿部)のうち、乾癬の症状や傷がない部位です。

注射をする部位*



二の腕(上腕部)の外側



おなか(下腹部)



太もも(大腿部)

*同じ部位に繰り返して注射をしないようにします。




トレムフィア®の投与スケジュール

トレムフィア®は、1回目に投与した後、2回目は4週間後、3回目からは8週間ごとの間隔で皮下投与します。

気になる症状などに十分注意しながら、別冊の「トレムフィア®治療ダイアリー」を活用してご自身の体調を管理しましょう。

トレムフィア®の投与スケジュール



トレムフィア®を投与した当日

注射した部位への刺激は避けてください。



トレムフィア®による治療中の注意

トレムフィア®は、体の中で免疫の一部の働きを弱める作用があるため、治療中には病原体やウイルスとたたかう力が弱くなる可能性があります。

トレムフィア®による治療を行っている間は、以下のことに注意してください。

日常生活

- かぜやインフルエンザなどの感染症から体を守るために、外出先から戻ったら、うがい・手洗いを行いましょう。



ワクチン接種

- インフルエンザの予防のために、流行前にインフルエンザワクチンを接種することが望ましいです。接種に関しては主治医にご相談ください。
- BCG、麻疹、風疹、おたふくかぜ、みずぼうそう、などの生ワクチンの接種は避けましょう。接種が必要なときには、主治医にご相談ください。

その他

- 妊娠または授乳を希望される方は、主治医にご相談ください。



副作用について

トレムフィア®を投与すると副作用が起こる可能性があります。必ず起こるものではありませんが、普段から体調管理を心がけ、体調の変化に十分気をつけましょう。気になる症状があれば、すぐに主治医に相談してください。

●投与後に起こりうる主な副作用

かぜ症状など感染症が疑われる症状

ノドが痛い、咳が出る、ゾクゾク(寒気が)する、頭痛がする、熱が出る、体がだるい、など。

注射部位反応

注射した部位が赤くなる、痛みを感じる、など。

白癬菌による感染症の症状

水虫やたむしによるかゆみ、など。

関節痛

関節が痛む、動かしにくい、など。

●その他の注意が必要な副作用

あてはまる症状があればすぐに主治医に連絡してください。

結核の再燃、肺炎などの重い感染症

過去に治療した結核がふたたび悪化したり(咳が続く、熱が出る、など)、肺炎などの重い感染症を発症した場合は、すぐに主治医に連絡してください。これらの感染症が完治するまでは、トレムフィア®の投与を中止します。



アナフィラキシーなどの重い過敏症

トレムフィア®投与後、30分以内に起こります。かゆみ、じんましんなどのアレルギー症状と似た症状の他、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、心臓の動きがいつもより早く感じる、意識が薄れてくる、などの症状があります。

副作用は早く見つけて、早く対応することがとても大切です。
普段から定期的に検査を受けて、少しでも体調がおかしいと感じたら、必ず主治医に相談しましょう。



トレムフィア®治療Q&A

Q トレムフィア®を投与すると、すぐに効果は現れますか？

A トレムフィア®の効果の現れ方には個人差がありますが、効果を実感できるのは投与開始からしばらく経過してからです。効果の判断は投与開始後一定の期間が経った後に検討することになります。

Q トレムフィア®による治療はいつまで続けるのでしょうか？

A 治療をいつまで続けるかについては、主治医にご相談ください。トレムフィア®は、IL-23の働きを抑えることで、皮膚や関節の症状を改善するお薬です。治療を継続することで、症状を抑えることができます。

Q トレムフィア®による治療はやめられますか？

A やめられますが、自己判断で中止しないでください。治療を中止すると、治療によって抑えられていた症状が現れる可能性があります。トレムフィア®の治療の中止を検討する場合には、主治医と一緒に、治療を中止することによるメリットやデメリットについてよく話し合ってください。治療の継続や中止について、あなたも主治医も納得した上で決めるでしょう。

Q 副作用が心配ですが、副作用は必ず現れるのでしょうか？

A 副作用は必ず起こるものではありません。かぜなどの感染症は、普段の体調管理、外出後のうがい・手洗いを心がけることで予防することも可能です。その他の注意が必要な副作用に関しては定期的な検査を行い、安全に継続治療できるよう確認します。

Q 来院時はどのような服装で行けばよいですか？

A 間診したり、検査したり、皮膚の状態を診たりしますので、脱ぎ着がしやすい服装で受診しましょう。

Q 投与予定日に体調が悪くなりました。

A 症状やその程度によっては、投与ができないことがあります。どのように体調が悪いのか、それはいつ頃からなのか、などを主治医にお伝えください。[→8、9ページ参照](#)

Q トレムフィア®を投与した当日に入浴してもよいですか？

A トレムフィア®を注射した当日の入浴は可能です。ただし、入浴の際は、ナイロンタオルなどでゴシゴシ擦ったりするなど、皮膚への刺激は避けてください。

Q 乾癬以外の持病があり、薬を飲んでいます。続けて飲んでもよいですか？

A 事前にどのような薬を服用しているか主治医に必ずお伝えください。

Q トレムフィア®による治療の費用はどの程度掛かりますか？

A トレムフィア®による治療費も含めた医療機関での支払額が一定金額を超えた場合、高額療養費制度が適用されるので、患者さんの年齢や収入によって負担額が変わってきます。

